

# CANIKUR® PRO

## Diät-Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Katzen

Zur Unterstützung der natürlichen Darmflora  
bei Hunden und Katzen



## Name

### Canikur® Pro

Diät-Ergänzungsfuttermittel zur Unterstützung der natürlichen Darmflora bei Hunden und Katzen

## Zusammensetzung

Sojaöl, inaktivierte Hefe, Lupinenproteinmehl, Glukose, Natriumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat, Sonnenblumenöl

### Inhaltsstoffe

Rohöle und -fette	43,6 %
Rohasche	21,1 %
Gehalt an salzsäureunlöslicher Asche	13,0 %
Rohprotein	6,0 %
Rohfaser	1,5 %

### Zusatzstoffe

*Enterococcus faecium* (DSM 10663 / NCIMB 10415) (Darmflora-Stabilisator):  $2 \times 10^{12}$  KBE / kg, Bentonit 1m5581i (Montmorillonit, Adsorptionsmittel): 17 %

Canikur® Pro enthält Probiotika (*E. faecium*), die natürlich in einer gesunden Darmflora vorkommen, sowie Präbiotika (Bio-Mos®-C), die das Wachstum gesundheitsförderlicher Bakterien im Darm unterstützen, und Montmorillonit, ein natürliches Adsorptionsmittel, das Toxine und Viren bindet und aus dem Organismus entfernt.

## Fütterungsempfehlung

Die Paste soll 2x täglich entsprechend der nachfolgenden Tabelle oral verabreicht werden:

	Hund				Katze
	≤10	11-25	26-40	>40	
Gewicht (kg):					
ml pro Dosis:	2	4	6	8	1-2

Drehen Sie den Ring an der Spritze bis zur gewünschten Dosierung und drücken Sie die Canikur® Pro Paste in den Futternapf oder direkt in das Maul des Hundes bzw. der Katze.

Verwenden Sie Canikur® Pro so lange, wie es als notwendig erachtet wird oder vom Tierarzt empfohlen wurde, aber nicht länger als 4 Wochen. Während einer Antibiotika-Behandlung verwenden Sie Canikur® Pro begleitend bis sieben Tage nach Beendigung der Antibiotika-Therapie.

## Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Zur Unterstützung und Erhaltung einer gesunden Darmflora bei einem erhöhten Risiko für, während oder zur Regeneration von Verdauungsstörungen (Durchfall). Canikur® Pro kann bei Störungen der Darmflora (z. B. bei akuten Durchfällen) allein oder in Kombination mit zusätzlich durch den Tierarzt verordneten Medikamenten eingesetzt werden. Zudem kann Canikur® Pro bei zu erwartenden negativen Einflüssen auf die Darmflora gegeben werden (z. B. in Stressphasen, bei Futterumstellung, während und nach Antibiotikagabe).

## Lagerungshinweise

Lagerung an einem trockenen Platz, vor Sonnenlicht und hohen Temperaturen geschützt.

## Datum der Information

Juli 2017

## Packungsgrößen

Spritze mit 15 ml  
Spritze mit 30 ml  
Display mit jeweils 12 Spritzen

Spritze mit 60 ml  
Verpackungskarton mit jeweils 6 Spritzen

[www.canikur.de](http://www.canikur.de)

08-394-17-D/ZVET/1006