

Diarsanyl Plus® (für Hunde und Katzen)

Diarsanyl Plus® (für Hunde und Katzen)



Paste zum Eingeben zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms bei Katzen und Hunden bei und nach akutem Durchfall

- [Erklärung](#)

Zusammensetzung

Fructo-Oligosaccharide, Dextrose, Glycerol, Natriumchlorid, Magnesiumsalze organischer Säuren

Zusatzstoffe:

Bentonit - Montmorillonit (E558) 40%, Kaliumsorbat (E202)

Analytische Bestandteile:

Rohasche: 30%, Feuchtigkeit: 22%, Gesamtzuckergehalt: 17,5%, Natrium: 2,5%, Rohprotein: 2,5%, Rohfaser: 2,5%, Kalium: 0,6%, Rohöle und -fette : 0%

Anwendung

Zur Linderung akuter Resorptionsstörungen des Darms bei Katzen und Hunden bei und nach akutem Durchfall.

Es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Tierarztes einzuholen. Das Produkt hat keinen Einfluß auf die üblicherweise während einer Durchfallerkrankung empfohlenen Tagesrationen.

Dosierung und Anwendungshinweise

Stellen Sie den Dosierring vor der ersten Anwendung auf den entsprechenden Teilstrich ein (Dosierung s. unten). Führen Sie die Injektorspitze seitlich in das Maul des Tieres ein. Drücken Sie den Injektorkolben bis zum Anschlag.

Für die weiteren Anwendungen verfahren Sie wie unten beschrieben.

Empfohlene Anwendungsdauer

3 Tage bis 2 Wochen.

Unter 7 kg Körpergewicht: Je ein Teilstrich morgens und abends, entsprechend zweimal täglich 1ml.

7-18 kg Körpergewicht: je einen Teilstrich morgens und abends, entsprechend zweimal täglich 2 ml.

18-30 kg Körpergewicht: je zwei Teilstriche morgens und abends, entsprechend zweimal täglich 4 ml.

Handelsform	Tiergewicht	Dosierung morgens	Dosierung abends
Diarsanyl® +10 ml	< 7 kg	1 Teilstrich	1 Teilstrich
Diarsanyl® +24 ml	7 - 18 kg	1 Teilstrich	1 Teilstrich
	18 - 30 kg	2 Teilstriche	2 Teilstriche

10 ml-Injektor: 1 Teilstrich entspricht 1 ml Diarsanyl® +

24 ml-Injektor: 1 Teilstrich entspricht 2 ml Diarsanyl® +

Handelsform

- 10 ml-Injektor für Katzen und Hunde unter 7 kg
- 24 ml-Injektor für Hunde von 7 bis 30 kg

FREI VERKÄUFLICH