

Imaverol®

Ein Tierarzneimittel gegen die Dermatophytose



In Europa seit 35 Jahren
auf dem Markt



Breitband-Antimykotikum



Die einzige externe
Behandlung auf der
Basis von Enilconazol



Das einzige topische
Medikament für mehrere Tierarten
(Hund, Pferd, Rind)

IHR VERBÜNDETER IM
KAMPF GEGEN DIE
DERMATOPHYTOSE



Gebrauchsanweisung

- 1** Die Imaverol-Lösung ist mit 50 Teilen lauwarmem Wasser unter Umrühren zu verdünnen, wodurch eine 0,2%ige Emulsion entsteht, die zum Waschen des Tieres verwendet wird.
Beispiele:

Für 500 ml fertige Emulsion	Für 1L fertige Emulsion	Für 5L fertige Emulsion
Geben Sie 10 ml Imaverol in ein Gefäß mit 490 ml Wasser	Geben Sie 20 ml Imaverol in ein Gefäß mit 980 ml Wasser	Geben Sie 100 ml Imaverol in ein Gefäß mit 4,9 L Wasser
		

Haltbarkeit der gebrauchsfertigen Emulsion: Die Emulsion ist jeweils frisch herzustellen und zum sofortigen Verbrauch bestimmt.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 3 Monate

- 2** Führen Sie 4 Behandlungen im Abstand von 3-4 Tagen durch



- 3** Die gebrauchsfertige Emulsion kann mit der Hand (Handschuhe benutzen), mit einem sauberen Schwamm, oder durch Sprühen mit einem Sprühgerät unter Druck aufgetragen werden. Die Haut gut befeuchten, gegen den Strich reiben und die Krusten so gut wie möglich beseitigen, um ein gutes Eindringen des Produkts zu gewährleisten.

Einfache Verwendung: Muss nicht abgewaschen werden

Zumindest bei der ersten Anwendung sollte der ganze Körper behandelt werden, auch wenn die Läsionen nur lokalisiert vorhanden sind, um die Sporen gründlich zu beseitigen, die überall auf der Haut und in den Haarfollikeln verteilt sein können.

Imaverol 100 mg/ml, Lösung zur Herstellung einer Emulsion zur Anwendung auf der Haut für Pferde, Rinder und Hunde, Wirkstoff: Enilconazol – **Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile:** 1 ml Lösung enthält: Wirkstoff(e): Enilconazol: 100 mg. Sonstige Bestandteile, deren Kenntnis für eine zweckgemäße Verabreichung des Mittels erforderlich ist: Polysorbat 20, Sorbitanlaurat – **Anwendungsgebiet(e):** Pilzkrankungen der Haut (Dermatomykosen) bei Pferden, Rindern und Hunden verursacht durch pathogene Pilze wie *Trichophyton verrucosum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Trichophyton equinum*, *Microsporum canis* – **Gegenanzeigen:** Stuten, von denen Milch als Lebensmittel gewonnen werden soll, sind von der Anwendung auszuschließen. – **Nebenwirkungen:** In seltenen Fällen wurden Störungen des Verdauungsapparates (Anorexie, Speicheln, Erbrechen) und des Nervensystems (Ataxie, Lethargie) beobachtet. – **Wartezeit:** Rind: essbare Gewebe: 4 Tage, Milch: 2 Tage, Pferd: essbare Gewebe: 4 Tage. – **Zulassungsinhaber:** AUDEVARD, 42-46 rue Médéric, 92110 Clichy (Frankreich). – **Verschreibungspflichtig** – **Genehmigungsdatum der Packungsbeilage:** Dezember 2018