

**Suspension zum Eingeben für Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen oder Ziervögel,
Brieftauben und Terrarium-Tiere**

**NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS UND, WENN
UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICH IST**

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
Hauptstraße 6 - 8
88326 Aulendorf
Deutschland

Dechra Veterinary Products GmbH
Hintere Achmühlerstraße 1a
6850 Dornbirn
Österreich

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Biokanol Pharma GmbH
Kehler Straße 7
76437 Rastatt
Deutschland

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Nystatin Dechra 100.000 I.E./ml Suspension zum Eingeben für Hauskaninchen, Kleinnager,
Frettchen oder Ziervögel, Brieftauben und Terrarium-Tiere

WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält:

Wirkstoff: 100.000 I.E. Nystatin

Sonstige Bestandteile: Saccharose

Gelbe Suspension mit Geruch und Geschmack nach Himbeere.

ANWENDUNGSGEBIET(E)

Hefepilzinfektionen im Magen-Darmtrakt.

GEGENANZEIGEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegen Nystatin
oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt. Falls Sie eine Nebenwirkung bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt ist, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

ZIELTIERART(EN)

Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen oder Ziervogel, Brieftauben und Terrarium-Tiere.

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Schmackhafte Suspension zum Eingeben.

Hauskaninchen, Kleinnager, Frettchen, Ziervogel, Brieftauben und Terrarium-Tiere: 1 ml/kg Körpergewicht 2-mal täglich über 14 Tage vorzugsweise über schmackhaftes Futter verabreichen oder mit einer Einzelspritze in den Mund des Tieres eingeben.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Flasche vor Gebrauch gut schütteln.

Zur Entnahme der Suspension Verschlusskappe abdrehen.

Originalpackung mit 48 ml Suspension (mit Dosierpumpe):

1 Hub entspricht 0,5 ml. 2 Hübe entsprechen 1 ml.

Flasche nach Entnahme verschließen.

WARTEZEIT(EN)

Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern.

Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

BESONDERE WARNHINWEISE

Für Tiere mit Diabetes mellitus ist der Gehalt an Saccharose zu beachten.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

GEBRAUCHSINFORMATION
Nystatin Dechra 100.000 I.E. /ml



DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

AT: Arzneimittel dürfen nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

WEITERE ANGABEN

Originalpackung mit 48 ml Suspension in einer Braunglasflasche mit Dosierpumpe im Faltkarton.

AT:

Diese Arzneispezialität wird gemäß § 7 Abs. 4 AMG in den Verkehr gebracht und ist nur für die in dieser Gebrauchsinformation genannten Tierarten bestimmt.