

GEBRAUCHSINFORMATION
Simeticon Dechra 41,2 mg /ml



Tropfen zur oralen Gabe für Hauskaninchen und Kleinnager

**NAME UND ANSCHRIFT DES PHARMAZEUTISCHEN UNTERNEHMERS UND, WENN
UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE
VERANTWORTLICH IST**

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dechra Veterinary Products Deutschland GmbH
Hauptstraße 6 - 8
88326 Aulendorf
Deutschland

Dechra Veterinary Products GmbH
Hintere Achmühlerstraße 1a
6850 Dornbirn
Österreich

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Biokanol Pharma GmbH
Kehler Straße 7
76437 Rastatt
Deutschland

BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Simeticon Dechra 41,2 mg Simeticon/ml Suspension, Tropfen zur oralen Gabe für
Hauskaninchen und Kleinnager

Simeticon

WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff:

Simeticon (Dimeticon und Siliciumdioxid im Verhältnis 97:3)

1 ml (= 22 Tropfen) enthält 41,2 mg Simeticon

Sonstige Bestandteile:

Bananen-Aroma

Milchig-trübe, zähflüssige Suspension mit Geruch und Geschmack nach Banane.

ANWENDUNGSGEBIET(E)

- Übermäßige, auch feinschaumige Gasbildung im Magen-Darm-Bereich etwa verursacht durch mikrobielle und parasitäre Infektionen, Futtermittelunverträglichkeit und Fehlernährung.
- Verstärkte Gasbildung nach Narkosen und Operationen.
- Hilfsmittel zur Diagnostik im Bauchbereich (Röntgen, Sonografie, Endoskopie).

GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.

NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

ZIELTIERART(EN)

Hauskaninchen und Kleinnager

DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Schmackhafte Suspension zum Eingeben. Hauskaninchen und Kleinnager: 33 - 44 Tropfen/kg Körpergewicht (entspr. 1,5 – 2 ml/kg Körpergewicht) 3 bis 6 mal täglich vorzugsweise direkt in den Mund des Tieres oder über das Trinkwasser verabreichen. Die Anwendung erfolgt in der Regel über einen bis mehrere Tage bzw. solange die Beschwerden bestehen. Simeticon Dechra kann bei Bedarf auch über längere Zeit verabreicht werden.

HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Hinweise für die richtige Anwendung: Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Zur Entnahme der Suspension Verschlusskappe abdrehen. Zum Tropfen wird die Flasche auf den Kopf gedreht und senkrecht gehalten. Das Abzählen der Tropfen empfiehlt sich besonders bei kleineren Mengen. Zur Entnahme größerer Volumina können Sie eine handelsübliche Einmalspritze in die Flaschenöffnung stecken. Flasche auf den Kopf drehen und das für eine Verabreichung erforderliche Volumen in die Spritze aufziehen. Bei Eingabe den Kopf des Tieres nicht hochhalten, damit es gut abschlucken kann. Nach Verabreichung Spritze gründlich mit Wasser ausspülen und trocknen lassen. Flasche nach Entnahme verschließen.

WARTEZEIT(EN)

Entfällt. Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nicht über 25 °C lagern.

Nach dem Öffnen 3 Monate haltbar. Das Arzneimittel nach Ablauf des auf dem Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

BESONDERE WARNHINWEISE

Nicht zutreffend.

BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

DE: Nicht aufgebrauchte Tierarzneimittel sind vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Bei gemeinsamer Entsorgung mit dem Hausmüll ist sicherzustellen, dass kein missbräuchlicher Zugriff auf diese Abfälle erfolgen kann. Tierarzneimittel dürfen nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

AT: Arzneimittel dürfen nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

WEITERE ANGABEN

Braunglasflasche mit 30 ml Inhalt im Faltkarton.

AT:

Diese Arzneispezialität wird gemäß § 7 Abs. 4 AMG in den Verkehr gebracht und ist nur für die in dieser Gebrauchsinformation genannten Tierarten bestimmt.